

მისია ინოვაციებშია

სამწუხაროდ, ბევრ პაციენტსა და მათი ოჯახის წევრებს სწორი დიაგნოზის დასასმელად ხანგრძლივი და რთული გზის გავლა უწევთ. სამედიცინო ცენტრი Altamedica, მსოფლიოს წამყვან კვლევით ცენტრებთან თანამშრომლობით, აქტიურად მონაწილეობს ადრეული დიაგნოსტიკის ახალი და ინოვაციური მეთოდების შემუშავებასა და დანერგვაში.



ალცჰაიმერის
დაავადების უსიმპტომო
ფაზა წლების
განმავლობაში შეიძლება

ჩვენ გვჯერა მომავლის

რატომ არის ჩვენი ტესტი საუკეთესო არჩევანი

- ◆ ანალიზი ეფუძნება მსოფლიოს წამყვანი სამედიცინო ცენტრების უახლეს სამეცნიერო კვლევებს
- ◆ კვლევისას გამოიყენება ინოვაციური, მაღალი სიზუსტისა და მგრძნობელობის მქონე ლაბორატორიული მეთოდები
- ◆ ანალიზი ტარდება იტალიის ქალაქ რომში, სამედიცინო ცენტრ Altamedica-ში
- ◆ პასუხი გაიცემა 18–20 სამუშაო დღის განმავლობაში

ჩვენ გვჯერა
პერსონალიზებული
მედიცინის
ძალის



დღეს უკვე შესაძლებელია
და აუცილებელიც არის
დაავადების ადრეულ ეტაპზე
მოქმედების დაწყება



www.eyes2eyes.net

e-mail: iteyes2eyes@gmail.com

Eyes2Eyes

in partnership
with

Altamedica

ALZHEIMER PRECOCITY SCREENING TEST

გაიგე შენი რისკი დღესვე -
პირველი სიმპტომების გამოვლენამდე
10–20 წლით ადრე

ALZHEIMER PRECOCITY SCREEING TEST

Alzheimer Precocity Screening Test საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების რისკი პირველი კოგნიტიური (შემეცნებითი) სიმპტომების გამოვლენამდე მრავალი წლით ადრე.

როგორც ცნობილია, ალცჰაიმერის დაავადება მრავალი წლის განმავლობაში შეიძლება უსიმპტომოდ ვითარდებოდეს.

დღეს, სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პროგრესის წყალობით, უკვე შესაძლებელია დაავადების ადრეული ბიოლოგიური ნიშნების გამოვლენა ჩვეულებრივი სისხლის ანალიზის საშუალებით.

რაც უფრო ადრე გამოვლინდება პრობლემა, მით უფრო ეფექტურია პრევენცია

ტესტი არ ცვლის ნევროლოგი სპეციალისტის მიერ ჩატარებულ სამედიცინო გამოკვლევას.

ტესტის შედეგები ყოველთვის უნდა შეფასდეს და განიმარტოს ნევროლოგი სპეციალისტის მიერ.



www.eyes2eyes.net
e-mail: iteyes2eyes@gmail.com

რა პარამეტრებს განსაზღვრავს ტესტი

ტესტი შექმნილია სისხლის პლაზმაში იმ ბიომარკერების გამოსავლენად, რომლებიც მონაწილეობენ ალცჰაიმერის დაავადების ადრეული ეტაპების განვითარებაში.

ბეტა-ამილოიდი(Aβ42 / Aβ40)

როდესაც ცილა **Aβ42** იწყებს თავის ტვინის ქსოვილებში ამილოიდური ფოლაქების (დაგროვებების) წარმოქმნას, მისი დონე სისხლში მცირდება **Aβ40**-თან შედარებით.

Aβ42 / Aβ40 შეფარდების შემცირება წარმოადგენს ამილოიდური ფოლაქების წარმოქმნის დაწყების ადრეულ სიგნალს

ფოსფორილირებული ტაუ-პროტეინი (p-Tau 217)

p-Tau 217-ის დონის მატება, რომელიც მიუთითებს ნეიროდეგენერაციული პროცესების დაწყებაზე, აღინიშნება დაავადების ადრეულ ეტაპებზე — პირველი კლინიკური სიმპტომების გამოვლენამდე დიდი ხნით ადრე.

ტესტის მთავარი უპირატესობა

ადრეული დიაგნოსტიკაა

ტესტის შედეგების ინტერპრეტაცია

ორი მაღალმგრძნობიარე ბიომარკერის გამოყენება ხელს უწყობს ადრეულ დიაგნოსტიკასა და რისკის შეფასებას

ანალიზის შედეგი უარყოფითია

ორივე ბიომარკერი ნორმის ფარგლებშია. კლინიკური მნიშვნელობა: არ ვლინდება ალცჰაიმერის დაავადებასთან დაკავშირებული ბიოლოგიური მექანიზმების არსებობის ნიშნები.

ანალიზის შედეგი ზღვრულია

ბიომარკერები ზღვრულ ზონაშია, აღინიშნება Aβ42 / Aβ40 მაჩვენებლის შემცირების ტენდენცია. კლინიკური მნიშვნელობა: ამილოიდური ფოლაქების დაგროვების საწყისი ეტაპი.

ანალიზის შედეგი დადებითია

ორივე ბიომარკერი პათოლოგიურ ზონაშია. კლინიკური მნიშვნელობა: მიმდინარეობს როგორც ამილოიდური ფოლაქების აქტიური დაგროვების, ასევე ნეიროდეგენერაციული პროცესის აქტიური ფაზა. რეკომენდებულია მონოკლონური ანტისხეულებით თერაპიის შესაძლებლობის განხილვა.



ანალიზისთვის საკმარისია ვენური სისხლის რამდენიმე მილილიტრი



ანალიზის პასუხი გაიცემა მაქსიმუმ 20 სამუშაო დღის განმავლობაში

www.eyes2eyes.net
e-mail: iteyes2eyes@gmail.com