

Миссия в инновациях

К сожалению, многим пациентам и членам их семей приходится преодолевать длительные “диагностические одиссеи”, для постановки корректного диагноза. Медицинский центр Altamedica, в сотрудничестве с ведущими мировыми исследовательскими центрами, принимает активное участие в создании новых и инновационных методов ранней диагностики.

ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ ИМЕННО НАШ ТЕСТ

- ◆ Анализ основан на современных исследованиях ведущих мировых медицинских центров
- ◆ Использование инновационных, высокоточных лабораторных методик
- ◆ Анализ проводится в медицинском центре Altamedica, в городе Рим, Италия
- ◆ Ответ в течении 18-20 рабочих дней



www.eyes2eyes.net

e-mail: iteyes2eyes@gmail.com



Мы верим в будущее

*Мы верим в
персонализированную
медицину*



*Бессимптомная фаза
при болезни
Альцгеймера длится годами*



*Вмешаться
на ранней стадии
сегодня можно и нужно*

ALZHEIMER PRECOCITY SCREENING TEST

Узнай **СЕГОДНЯ** свой
риск
за **10-20 лет** до появления
первых симптомов

Eyes2Eyes

в партнерстве

с Altamedica

ALZHEIMER PRECOCITY SCREENING TEST

Alzheimer Precocity Screening Test позволяет определить риск развития болезни Альцгеймера за многие годы до появления первых когнитивных симптомов.

Как известно, болезнь Альцгеймера долгие годы развивается в **абсолютно бессимптомной форме**.

Сегодня, благодаря научному и технологическому прогрессу, стало возможным выявить **ранние биологические маркеры болезни** с помощью банального анализа крови.

**ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫЯВЛЕНА
ПРОБЛЕМА,
ТЕМ ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРЕВЕНЦИИ**

Тест **не заменяет** обследование у врача специалиста в области неврологии.

Результаты теста должны быть **всегда интерпретированы** врачом специалистом в области неврологии.



www.eyes2eyes.net
e-mail: iteyes2eyes@gmail.com

КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕСТ

Тест направлен на поиск в плазме крови биомаркеров, вовлеченных в механизмы ранних стадий болезни Альцгеймера.

Бета-амилоид (Aβ42 / Aβ40)

Когда белок **Aβ42** начинает формировать амилоидные бляшки в тканях головного мозга, его уровень в крови уменьшается, по сравнению с **Aβ40**.

Уменьшение отношения Aβ42 / Aβ40 ранний сигнал начала формирования амилоидных бляшек.

Фосфорилированный Тау-протеин (p-Tau 217)

Увеличение содержания **p-Tau 217**, указывающий на начало нейро-дегенеративных процессов, наблюдается в ранних стадиях болезни, задолго до появления первых клинических симптомов.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА

Использование двух высокочувствительных биомаркеров способствует ранней диагностике и стратификации риска

Анализ негативный

Оба биомаркера в пределах нормы. Клиническое значение: отсутствие биологических механизмов, связанных с болезнью Альцгеймера

Анализ пограничный

Биомаркеры в пограничной зоне, преобладает уменьшение уровня Aβ42 / Aβ40. Клиническое значение: начальная стадия аккумуляции амилоидных бляшек.

Анализ положительный

Оба биомаркера в патологической зоне. Клиническое значение: идет активный процесс как аккумуляции амилоидных бляшек, так и нейро-дегенеративный процесс. Рассмотреть возможность терапии моноклональными антителами.

Главное
преимущество теста

**РАННЯЯ
ДИАГНОСТИКА**



ДЛЯ АНАЛИЗА ДОСТАТОЧНО
НЕСКОЛЬКО МЛ ВЕНОЗНОЙ
КРОВИ



ОТВЕТ НА АНАЛИЗ
МАКСИМУМ В ТЕЧЕНИИ 20
РАБОЧИХ ДНЕЙ

www.eyes2eyes.net
e-mail: iteyes2eyes@gmail.com